

STEGLUJAN® (ertugliflozin och sitagliptin) fast doskombination av SGLT-2-hämmare och DPP-4-hämmare, Rx, (F), tabletter 5 mg/100 mg och 15 mg/100 mg, SPC 05/2019

INDIKATIONER: för vuxna från 18 års ålder med typ 2-diabetes mellitus, som ett tillägg till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen:

- när metformin och/eller sulfonyleurea (SU) och en av komponenterna i Steglujan inte ger adekvat glykemisk kontroll
- hos patienter som redan behandlas med kombinationen ertugliflozin och sitagliptin som separata tabletter

Subventioneras endast för patienter som inte uppnått tillräcklig glykemisk kontroll vidbehandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket