


**Simponi[®] kan förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 ° C)
i upp till 30 dagar.**



25°c



**30
dagar**



Simponi kan förvaras vid temperaturer upp till högst **25°C** under en enstaka period i högst **30 dagar**, men utan att det ursprungliga utgångsdatumet tryckt på kartongen passeras. Det nya utgångsdatumet måste skrivas på kartongen (högst 30 dagar efter uttag från kylskåp).

Efter förvaring i rumstemperatur får Simponi inte förvaras i kylskåp igen. Simponi måste kasseras om det inte används inom 30 dagars förvaring i rumstemperatur.

Kan förvaras i kylskåp (2°C – 8°C). Får ej frysas.
Förvara den förfyllda injektionspennan eller
den förfyllda sprutan i ytterkartongen.
Ljuskänsligt.

Simponi® (*golimumab*) är en TNF-hämmare, 50 mg, 100 mg och 45 mg/0,45 ml injektionslösning i förfylld injektionsspenna och 50 mg även i förfylld spruta, Rx.

Subventionsstatus: Simponi subventioneras endast när behandling med etanercept eller adalimumab inte är lämpligt. SPC 10/2021

Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; svår aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Simponi i kombination med metotrexat (MTX), är avsett för behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) hos barn 2 år och äldre, som svarat otillräckligt på tidigare behandling med MTX.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).

Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter hos patienter behandlade med TNF-hämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling.

För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se.

Referens: Simponi® (*golimumab*) SPC 10/2021



msd.se 08-578 135 00
Copyright©2022 MerckSharp Dohme Corp., Kenilworth, NJ,
USA: Allrights reserved. SE-GOL-00022 02/2022