

Så här förbereder du M-M-RvaxPRO

Steg för steg

M-M-RVAXPRO® – vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund


STEG 1:

Förbered brickan. Blandningskanylen skall inte vara större än 23 G.




STEG 2:

Sätt på blandningskanylen. Placera den ordentligt på sprutans spets och vrid den ett kvarts varv (90°).



STEG 3:

Injicera allt innehåll i sprutan i pulverflaskan.



STEG 4:

Låt kanylen sitta kvar i pulverflaskan. Skaka försiktigt för att blanda väl.




STEG 5:

Dra upp allt innehåll ur flaskan med det färdigberedda vaccinet i samma spruta.



STEG 6:

Byt till injektionsnål enligt lokal rekommendation. Injicera hela volymen.



- M-M-RVAXPRO® Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Förfylld spruta.
- En nål ska användas för beredning och en separat ny nål ska användas för injektion.
- Före beredning är pulvret en ljusgul kompakt kristallin kaka och vätskan är klar och färglös. När vaccinet är helt blandat är det en klar, gul vätska.
- Det färdigberedda vaccinet får inte användas om några partiklar observeras eller om utseendet på spädningsvätska eller pulver eller på det färdigberedda vaccinet skiljer sig från beskrivningen ovan.
- Efter beredning rekommenderas omedelbar administrering av vaccinet för att minimera aktivitetsförlust, alternativt inom 8 timmar vid förvaring i kylskåp. Färdigberett vaccin får inte frysas. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

För att undvika främmande material i vaccinet skall inte blandningskanylen vara större än 23 G.

M-M-RvaxPro® är ett levande försvagat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehållande mässlingvirus (stam Enders Edmonston B), påssjukevirus (stam Jeryl Lynn) och rubellavirus (stam Wistar RA 27 /3). Indicerat för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund av personer från 12 månaders ålder. Kan under särskilda omständigheter administreras till barn från 9 månaders ålder. För användning vid mässlingutbrott, vid vaccination efter exponering eller till tidigare ovaccinerade individer äldre än 9 månader som är i kontakt med mottagliga gravida kvinnor, samt till personer som kan antas vara känsliga för påssjuka och röda hund. M-M-RvaxPro ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.

M-M-RvaxPro pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Rx, Subventioneras ej.

Kontraindikationer: överkänslighet mot något mässling-, påssjuka- eller röda hundvaccin eller överkänslighet mot något hjälpämne, inklusive neomycin. Graviditet, graviditet ska dessutom undvikas i 1 månad efter vaccination. Sjukdomstillstånd med feber >38,5°C. Aktiv obehandlad tuberkulos. Bloddyskrasi, leukemi, alla typer av lymfom eller annan malign neoplas i blod- eller lymfsystemet. Pågående immunsuppressiv terapi (inklusive höga doser av kortikosteroider). Topikala kortikosteroider eller parenterala kortikosteroider i lågdos utgör dock inte en kontraindikation för vaccinering. Allvarligt humoralt eller cellulärt (primärt eller förvärvat) immunbristtillstånd. Medfödd eller ärftlig immundefekt i anamnesen, såvida inte immunkompetensen hos den tilltänkta mottagaren kunnat visas.

Vaccinet ska aldrig injiceras intravaskulärt. Försiktighet bör iaktas vid tidigare allergisk reaktion mot ägg eller något som innehåller ägg, då vaccinet tillverkats i cellkultur från kycklingembryo. Försiktighet bör iaktas när ges till en ammande moder.

Datum för översyn av produktresumé 06/2022

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se